

## CISTUS SSP POPULIFOLIUS



Nombre Botánico: ***Cistus populifolios***

Nombre Común: **Jara cervuna**

Biotipo: Arbustivo con porte erecto.

Altura : de 75 a 125 cm.

Tipo hoja: Sus hojas son simples, opuestas, largamente pecioladas, estrechadas en la punta y acorazonadas en la base, de manera que se pueden asemejar a las del álamo.

Época de floración: abril-julio, para fructificar a principios de otoño.

Color de la flor: Flor blanca muy vistosa.

HÁBITAT:

Clima: mediterráneo cálido.

Preferencias Edáficas: suelos silíceos. Tolera la cal y la sal.

Época de siembra: primavera-otoño.

Nº sem/g : 5.000 sem

Consejos de siembra: Las semillas de Cistus populifolius (jara cerval) poseen una cubierta dura

### OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·  
Valencia  
[www.intersemillas.es](http://www.intersemillas.es)

### CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01  
WhatsApp +34 608 977 697  
Email [intersemillas@intersemillas.es](mailto:intersemillas@intersemillas.es)

que requiere un pretratamiento para romper su latencia. Los métodos más efectivos incluyen el tratamiento térmico con agua a 100 °C durante 5 minutos o un lavado con agua tibia por 24 horas. Luego, se siembran en sustrato drenado a una temperatura máxima de 5 °C.

- Métodos de tratamiento pregerminativo : Para lograr una germinación exitosa (que suele tardar entre 7 y 30 días), prepara las semillas mediante una de las siguientes opciones:

Choque térmico: Sumerge las semillas en agua a 100 °C durante exactamente 5 minutos.

También se obtienen excelentes resultados dejándolas en agua a 80-90 °C y permitiendo que se enfríen lentamente durante 24 horas. Lavado prolongado: Remójalas en agua tibia durante 24 horas antes de la siembra para ablandar la cubierta externa.

Siembra y cuidados: Siembra preferiblemente en otoño o a principios de primavera. Sustrato: Utiliza una mezcla arenosa y bien drenada para evitar encharcamientos. Profundidad: Cubre las semillas ligeramente, no más de 1 cm a 2 cm de profundidad. Condiciones: Mantén el semillero en un lugar fresco, con una temperatura que no supere los 5 °C (algunos expertos recomiendan el ciclo de 20 °C por 21 días). Humedad: Mantén el sustrato húmedo pero no empapado hasta que germinen.

Recomendaciones de cultivo para planta destinada a Reforestación: Utilización de sustratos porosos y con buena aireación en contenedores antiespiralizantes. Nunca debe haber encharcamiento. Sobreelevación del contenedor sobre el terreno de 10-15 cm para producir autorepicado radial. La altura recomendada del contenedor es de 15 cm como mínimo para las resinosas y de 18 cm para las frondosas. La sección mínima recomendada para la boca del contenedor tiene que ser de 22 cm.

La densidad máxima de cultivo recomendada es del orden de 300 brizales por m<sup>2</sup>.

## OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·  
Valencia  
[www.intersemillas.es](http://www.intersemillas.es)

## CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01  
WhatsApp +34 608 977 697  
Email [intersemillas@intersemillas.es](mailto:intersemillas@intersemillas.es)