

NORDAMANNIANA



Biotipo: árbol.

Altura: 20-40 m. Porte: cónico.

Tipo hoja: simples aciculares aisladas en dos direcciones, de tamaño pequeño, longitud 2-3 cm., color verde oscuro en el haz y plateado en el envés, textura lisa y época de foliación mediados de primavera.

Época fructificación: finales de otoño.

Tipo de fruto: cono-piña, longitud 15-17 cm. y color de verde a pardo violáceo.

Epoca de floración: mediados de primavera. Tratamientos previos a la siembra: un enfriamiento previo de la semilla durante 1-30 días a 2-5° C, favorece la germinación. También se consigue

OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·
Valencia
www.intersemillas.es

CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01
WhatsApp +34 608 977 697
Email intersemillas@intersemillas.es

acelerar y mejorar la germinación si previamente se estratifica la semilla durante 30-90 días en arena o turba húmeda a una temperatura de 2-5° C. La inmersión de la semilla en agua corriente antes de su siembra no suele tener efecto alguno sobre la germinación.

OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·
Valencia
www.intersemillas.es

CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01
WhatsApp +34 608 977 697
Email intersemillas@intersemillas.es