

OXYCEDRUS



Biotipo: arbusto.

Altura: 3-5 m.

Porte: forma cónica.

Tipo hoja: de tipo acicular, persistentes, en verticilos de 3, rígidas, espinosas, de 1.5 cm. de largo, color verde azulado con dos líneas blancas centrales.

Época fructificación: principios de otoño.

Tipo de fruto: gálbulo globoso y carnoso, de 1 cm. de longitud y color verde que pasa a rojo marrón en la maduración. Época de floración: de invierno a abril-mayo.

Tratamientos previos a la siembra: para vencer el letargo interno que presentan estas semillas

OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·
Valencia
www.intersemillas.es

CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01
WhatsApp +34 608 977 697
Email intersemillas@intersemillas.es

será conveniente la estratificación en turba o arena húmeda durante 3-4 meses a 3-4° C. Este tratamiento se puede sustituir por un tratamiento con ácido sulfúrico.

Procedencias usuales:

E-237-23 Sistema Ibérico Oriental

E-237-25 Sistema Ibérico Meridional

OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·
Valencia
www.intersemillas.es

CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01
WhatsApp +34 608 977 697
Email intersemillas@intersemillas.es