

PINASTER



Biotipo: árbol. Altura: 20-30 m. Porte: forma cónica Tipo hoja: perennes, acículas en pares de 25 cm. De longitud y color verde oscuro brillante no resinosas. Época Fructificación: otoño. Tipo de Fruto: cono-piña de color marrón grisáceo y longitud de 10-25 cm Época de Floración: mediados de primavera Tratamientos previos a la siembra: Inmersión previa a la siembra durante 4-6 h. Si tiene una latencia muy pronunciada puede someterse a inmersión en agua a 16-20° C durante 10 días, a continuación colocar las semillas en una cámara frigorífica a 2° C durante 3-5 meses, luego se pasan a temperatura ambiente para eliminar el exceso de agua absorbida durante el tratamiento.

Procedencias usuales:

OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·
Valencia
www.intersemillas.es

CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01
WhatsApp +34 608 977 697
Email intersemillas@intersemillas.es

- ES-26-12 Serranía de Cuenca

OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·
Valencia
www.intersemillas.es

CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01
WhatsApp +34 608 977 697
Email intersemillas@intersemillas.es