

PISTACIA TEREBINTHUS



Nombre Botánico: ***Pistacia terebinthus***

Nombre Común: **Cornicabra**

Biotipo: Arbustiva.

Altura : 100-500 cm.

Ciclo de vida: perenne.

Tipo hoja: Hojas alternas, compuestas, imparipinnadas, con 3 o 9 folíolos de color verde intenso; de unos 10 cm o más de longitud y textura semicoriácea. Generalmente, son más grandes y redondeadas que las del lentisco, recordando a las hojas del algarrobo.

Época floración: Florece en primavera, típicamente entre abril y junio. La fructificación se desarrolla a lo largo del verano, y los frutos maduran adquiriendo un tono rojizo para posteriormente secarse y pardear entre

Color de la flor: Verdosa.

HABITAT

Clima: Mediterráneo y submediterráneo

Preferencias edáficas: Sus preferencias edáficas destacan por una alta tolerancia y rusticidad. Es una especie calcícola (prefiere suelos calizos), pero muestra gran plasticidad y también prospera en terrenos silíceos.

Época de siembra: Finales de otoño o durante el invierno en climas suaves. Si se planta en

OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·
Valencia
www.intersemillas.es

CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01
WhatsApp +34 608 977 697
Email intersemillas@intersemillas.es

contenedor, se puede trasplantar casi todo el año evitando las olas de calor. Para germinar desde semilla, las fechas ideales son a principios de primavera o durante el

Nº sem/ gramo: 14 sem

Consejos de siembra y cultivo: Las semillas de Pistacia terebinthus (cornicabra) presentan una latencia natural debido a su cubierta dura. Es por ello que necesitan tratamientos pregerminativos. Para garantizar y acelerar la germinación, es fundamental ablandar la cubierta y simular el invierno mediante frío. Tratamiento aconsejados :

- Selección y limpieza: Asegúrate de usar semillas maduras (evita las que sean completamente rojas, ya que suelen estar vacías). Si conservan pulpa o pellejo, sumérgelas en agua y frótalas con cuidado para retirarlo
- Remojo previo: Sumerge las semillas en agua tibia durante 72 horas, cambiando el agua diariamente. Esto hidrata el embrión e inicia el proceso.
- Estratificación en frío: Para romper la latencia, estratifica las semillas en frío húmedo. Colócalas en un recipiente con vermiculita, arena ligeramente húmeda o entre servilletas de papel húmedas, e introdúcelas en la nevera (entre 3°C y 5°C) durante 2 a 3 meses.
- Siembra: Pasado el tiempo de frío, plántalas a 1-2 cm de profundidad en semilleros con un sustrato suelto y buen drenaje. Mantén una temperatura constante de 20°C a 25°C y una humedad constante pero sin encharcar.

GALERÍA DE IMÁGENES



OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·
Valencia
www.intersemillas.es

CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01
WhatsApp +34 608 977 697
Email intersemillas@intersemillas.es