

REGINAE



Hojas: ovaladas, elípticas, provistas de nervadura central muy marcada, muy grandes, anchas hasta de 20 cm y hasta de 50 cm de largas, coriáceas, las nervaduras marcadas y portadas por pecíolos de 100-150 cm de largo.

Las inflorescencias: con largos tallos, más largos que los foliares, de forma cilíndrica y erguidos, están formadas por una espata coriácea verde, ligeramente variegada de rojo. En el interior de la espata se encuentran 5 - 8 flores que en la *Strelitzia reginae* son de color anaranjado con tres tépalos azules.

Tratamiento: Puede presentar dos tipos de Letargo: externo e interno. Semilla fresca, (se deshidrata en pocas semanas), inmersión en agua tibia durante 24 horas y posterior siembra.

Semillas menos fresca (lo normal, más o menos deshidratada):

•
Escarificación de la cubierta (manual o sulfúrico) y posterior inmersión en agua 48 horas.
Siembra en sustrato.

•
Inmersión durante 48 horas en agua tibia y posteriormente inmersión durante 2 horas a unos 50° C. Siembra en sustrato.

•
Inmersión en agua 48 horas y posteriormente poner en un recipiente plástico con un material inerte que mantenga humedad y situar en oscuridad a 20-25°C.

OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·
Valencia
www.intersemillas.es

CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01
WhatsApp +34 608 977 697
Email intersemillas@intersemillas.es

OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·
Valencia
www.intersemillas.es

CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01
WhatsApp +34 608 977 697
Email intersemillas@intersemillas.es