ROBUR

OFICINA CENTRAL
Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla · Valencia
www.intersemillas.es

CONTACTO
Tel. +34 96 164 01 01
WhatsApp +34 608 977 697
Email intersemillas@intersemillas.es

Biotipo: árbol.
Altura: hasta 45 m.
Porte: forma esférica irregular.
Tipo hoja: caducas, oblongas, de 5-12 cm. de largo, con 6-14 lóbulos redondeados, color verde oscuro por encima y verde azulado pálido por debajo, ocres en otoño.
Época Fructificacion: principios de otoño.
Tipo de Fruto: núculas denominadas bellotas, desprovistas de albumen, pero con cotiledones gruesos y carnosos, agrupadas a pares y miden 2-3 cm.
Época de Floracion: mayo-junio.
Tratamientos previos a la siembra: las semillas de este género germinan bien sin necesidad de tratamiento previo si se siembran en otoño o, se conservan en arena húmeda durante el invierno para su siembra en primavera. Si se han guardado en seco, es conveniente una estratificación en arena o turba húmeda durante 30-60 días a 0-2° C antes de su siembra en primavera.
Procedencias usuales:
• ES-41-05 Litoral vasco-navarro
• ES-41-06 Región vasco-navarra