

SUBER



OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·
Valencia
www.intersemillas.es

CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01
WhatsApp +34 608 977 697
Email intersemillas@intersemillas.es

Biotipo: árbol.

Altura: 6-20 m.

Porte: forma oblonga.

Tipo hoja: hojas alternas, limbo de ovado-lanceolado a oblongo, coriáceo, haz glabrescente y envés tomentoso-blanquecino.

Época Fructificación: las bellotas maduran en el otoño y al principio del verano las de la floración del otoño. Tipo de Fruto: bellotas ovoide-oblongas, de 1-3 cm. de largo.

Época de Floración: florece en abril-mayo, normalmente vuelve a florecer en otoño.

Tratamientos previos a la siembra: las semillas de este género germinan bien sin necesidad de tratamiento previo si se siembran en otoño o, se conservan en arena húmeda durante el invierno para su siembra en primavera. Si se han guardado en seco, es conveniente una estratificación en arena o turba húmeda durante 30-60 días a 0-2° C antes de su siembra en primavera.

Procedencias usuales:

- ES-46-05 S^a Morena Occidental
- ES-46-42 S^a de Ronda

OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Loriguilla C/2 esquina con C/5 46393 Loriguilla ·
Valencia
www.intersemillas.es

CONTACTO

Tel. +34 96 164 01 01
WhatsApp +34 608 977 697
Email intersemillas@intersemillas.es